

Link do produktu: <https://progsmlpl/beaphar-lactol-kitty-milk-preparat-mlekozastepczy-dla-kociat-250g-p-551083.html>



Beaphar Lactol Kitty Milk - preparat mlekozastępczy dla kociąt 250g

Cena	83,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	mls15808
Kod producenta	8711231152391
Kod EAN	8711231152391
Producent	Beaphar

Opis produktu

Beaphar Lactol Kitty Milk - mleko w proszku dla kociąt

Pełnoporcjowy preparat mlekozastępczy dla kociąt do 35. dnia życia.

Poleca się również jako dodatek do pożywienia dla kotek ciężarnych i w okresie laktacji.

Krowie mleko dostarcza zbyt mało białka i tłuszczu, natomiast Kitty Milk jest źródłem zbilansowanych, tłuszczów, witamin i minerałów.

Skład:

Mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze, minerały.

Analiza:

Białko surowe 24%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 24%, popiół surowy 7%, wilgotność 3,5%, wapń 0,8%, fosfor 0,7%, sód 0,5%, magnez 0,16%, potas 1,5%.

Dodatki dietetyczne (zawartość w kg)

witamina A 25.000 IU., witamina D3 2000 IU., witamina B1 5 mg, witamina B2 3 mg, witamina B6 3 mg, witamina B12 60 µg, witamina C 620 mg, witamina E 210 j.m., biotyna 50 µg, witamina K3 3 mg, tauryna 3000 mg, D-pantotenian wapnia 10 mg, żelazo (Fe) 80 mg, jod (I) 0,25 mg, mangan (Mn) 30 mg, selen (Se) 0,2 mg, DL-metionina 3000 mg.

Stosowanie:

Umieścić w butelce odpowiednią, odmierzoną ilość proszku mlecznego. Dodać Kitty Milk do ciepłej, nie wrzącej wody i mieszać do całkowitego rozpuszczenia. Po schłodzeniu do temperatury 38°C mleko jest gotowe do podania.

Starsze zwierzęta mogą preferować picie zimnego Kitty Milk. Zaleca się podawać mleko młodemu zwierzętom w sterylnym zestawie do karmienia.

Przygotowane mleko może być przechowywane w lodówce do 24 godzin. Zwierzęta muszą mieć stały dostęp do czystej, świeżej wody, którą należy wymieniać każdego dnia.

Rekomendowane proporcje:

- 31,5 g wymieszać z 100 ml ciepłej wody

Zalecana dzienna dawka:

- nie można podać dokładnej ilości dziennej dawki z powodu znacznych różnic odnośnie wieku, wielkości i rasy - najlepszym rozwiązaniem będzie "karmienie na żądanie".

Poniżej podane są w tabeli przybliżone wytyczne dotyczące karmienia. Należy pamiętać, aby codziennie kontrolować wagę zwierzęcia.

Waga kociąt (g)	Max. dzienna dawka (ml)
100	50
200	80
400	135
600	180
1000	250

Wiek (w dniach)	Ilość posiłków
2 - 7	8 - 12 (co 2-3 godziny, także w nocy)
8 - 21	8 (co 3 godziny, także w nocy)
22 - 28	6 - 8 (co 3-4 godziny, także w nocy)
29 - 35	4 - 6 (włącznie z nocnym 1 karmieniem)
36 - 42	3
43 - 49	0 - 3

Osierocone kocięta:

Jeśli kociąt nie można dostawić do innej karmiącej kotki, wówczas obowiązki związane z karmieniem, pielęgnacją i nauką musi przejąć opiekun. Poniższe wskazówki stanowią zarys postępowania przy karmieniu kociąt. Należy regularnie kontrolować otwór w smoczku w ten sposób, aby po odwróceniu butelki mleko kapło z niego kroplami. Jeżeli otwór będzie zbyt duży kocię może się zadławić. Natomiast zbyt mały otwór może powodować zasysanie powietrza. Ponadto należy sprawdzać, czy nie doszło do zatkania otworu. Regularnie przeprowadzać sterylizację butelek i smoczków. Po każdym karmieniu należy masować brzuszek i okolice odbytu u kociąt w celu stymulacji odruchu oddawania moczu.

Żywnienie uzupełniające:

Gdy Kitty Milk stosuje się jako karmę uzupełniającą dla kociąt przebywających ze swą matką, zaleca się, aby najmniejsze i najsłabsze kocięta pozostawić kotce do wykarmienia, zapewniając im dostęp do dodatkowych walorów mleka matki, zaś pokarm mlekozastępczy podawać silniejszym kociętom, zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Ilości pokarmu podawane odstawionym kociętom:

- 36 - 42 dzień życia: do 4,0% masy ciała = 40 ml/kg
- 43 - 49 dzień życia: do 1,3% masy ciała = 13 ml/kg

Ilości mleka przy dokarmianiu dodatkowym dla kociąt w okresie wzrostu i osobników dorosłych:

- Ciężarne kotki lub karmiące matki, zwierzęta chore lub po rekonwalescencji: do 1,3% masy ciała = 13 ml/kg

Odstawienie kociąt:

Po 36. dniu życia zwierzęcia należy powoli zmieniać dietę na bardziej solidną, włączając mięso mielone, pokarm dla kociąt, itp. Ilości podawania Kitty Milk powinny być stopniowo zmniejszane w okresie przyzwyczajania zwierzęcia do stałego, gotowego pokarmu lub przygotowanego w domu + woda do picia.