

Link do produktu: <https://progsm.pl/francodeX-przysmak-dla-swinki-morskiej-z-witamina-c-50g-fr174132-p-540281.html>



Francodex Przysmak dla świnki morskiej - z witaminą C 50g [FR174132]

Cena	17,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	mls18692
Kod producenta	3283021741320
Kod EAN	3283021741320
Producent	Francodex

Opis produktu

Karma uzupełniająca - przekąski z witaminą C dla świnek morskich

Przekąski z witaminą C FRANCODEX są oryginalnym sposobem na podawanie świnkom morskim codziennej dawki witaminy C. Mogą być używane jako główne źródło witaminy C lub jako suplementacja innego źródła witaminy C (napój, świeże rośliny, tabletki itp.). Codzienne zapotrzebowanie zdrowych świnek morskich na witaminę C wynosi 20 mg/kg. Zapotrzebowanie to wzrasta trzykrotnie podczas choroby, rekonwalescencji, ciąży i laktacji (60 mg/kg).

Sposób użycia:

- prewencyjnie: świnki morskie o wadze <1 kg - 2 przekąski dziennie. Świnki morskie o wadze >1 kg - 3 przekąski dziennie
- w okresie rekonwalescencji, ciąży i laktacji: potroić dawkę, tj. podawać 6 przekąsek dziennie.

Zaleca się odczekanie do zakończenia okresu odsadzania od matki (w wieku 10 tygodni) przed rozpoczęciem podawania przekąsek młodym gryzoniom.

Karma uzupełniająca nie zastępuje zbilansowanego żywienia.

Zużyć w ciągu miesiąca od otwarcia.

Środki ostrożności:

zapewnić swobodny dostęp do świeżej wody. W razie używania z innymi suplementami witaminy C przestrzegać zalecanych dawek dziennych. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Skład:

zboża, oleje i tłuszcze, produkty uboczne pochodzenia roślinnego (inulina 0,25%), owoc (jabłko w proszku 1%), substancje mineralne.

Dodatki (/kg):

dotatki odżywcze - witamina C 11111 mg, witamina E (RRR alfa-tokoferol) 112 mg, witamina A 1000 IU, witamina D3 150 IU. Dodatki sensoryczne - wyciąg z Echinacei 3000 mg - przeciwutleniacz.

Składniki analityczne:

białko surowe 8%, popiół surowy 2%, tłuszcz surowy 27% (kwasy tłuszczowe Omega-3: 1,2%), włókno surowe 2,5%, wilgotność 7%.

