proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 02:15

Link do produktu: https://progsm.pl/royal-canin-veterinary-diet-feline-urinary-s-o-in-loaf-saszetka-85g-p-539665.html



Royal Canin Veterinary Diet Feline Urinary S/O in loaf saszetka 85g

Cena	**7,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**mls16462**
Kod producenta	**9003579027745**
Kod EAN	**9003579027745**
Producent	**Royal Canin Veterinary Diet**

Opis produktu

Urinary S/O in loaf

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla kotów w formie pasztetu, stworzona aby rozpuszczać kamienie struwitowe i zapobiegać ich ponownemu powstawaniu, dzięki właściwościom zakwaszającym mocz.

ZALECENIA: Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Dietę URINARY S/O należy stosować przez 5-12 tygodni w celu rozpuszczenia kamieni struwitowych oraz do 6 miesięcy w celu zapobiegania ich ponownemu tworzeniu. Należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody.

Wskazania:

- Kamica struwitowa: rozpuszczanie istniejących kamieni i zapobieganie nawrotom
- Kamica szczawianowo-wapniowa: zapobieganie nawrotom
- Idiopatyczne zapalenie pęcherza (Feline idiopathic cystitis, FIC)

Przeciwwskazania:

- Przewlekła niewydolność nerek (Chronic Kidney Disease, CKD)
- Choroby serca (w przypadku koniecznosci ograniczenia poziomu sodu)
- Jednoczesne stosowanie środków zakwaszających mocz
- Ciąża / laktacja i okres wzrostu

IDIOPATYCZNE ZAPALENIE PĘCHERZA

Dzięki wysokiej wilgotności dieta Urinary S/O Feline w postaci mokrej zwiększa rozcieńczenie moczu. Niemal 64% przypadków chorób dolnych dróg moczowych to idiopatyczne zapalenie pęcherza. W przypadku nawrotów choroby zalecane jest podawanie diety w postaci mokrej.

ROZPUSZCZANIE KAMIENI STRUWITOWYCH

Dieta URINARY S/O Feline skutecznie rozpuszcza kamienie struwitowe.

ZMNIEJSZONE WYSYCENIE MOCZU (RSS)

Mocz o niskim wysysceniu stanowi niekorzystne środowisko do powstawania zarówno kryształów struwitowych, jak i szczawianowo-wapniowych.

ROZCIEŃCZENIE MOCZU

Rozcieńczenie moczu zmniejsza stężenie obecnych w nim struwitów i szczawianów wapnia. Zwiększona objętość moczu wspomaga również częstsze opróżnianie pęcherza.

Skład:

mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, minerały, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, cukry.

Dodatki (na 1 kg karmy):

Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 50 UI, E1 (Żelazo): 3 mg, E2 (Jod): 0,3 mg, E4 (Miedź): 2,5 mg, E5 (Mangan): 0,9 mg, E6 (Cynk): 9 mg - Dodatki technologiczne: (regulator kwasowości) Wodorosiarczan sodu: 0,5 g.

Składniki analityczne:

Białko surowe: 11,0% - Oleje i tłuszcze surowe: 3,5% - Popiół surowy: 2,2% - Włókno surowe: 1,0% - Wilgotność: 79,5% - Tauryna (łącznie): 0,1% - Wapń: 0,25% - Fosfor: 0,25% - Sód: 0,3% - Magnez: 0,016% - Potas: 0,22% - Chlorki: 0,4% - Siarka: 0,23% - Substancje zakwaszające mocz: Siarczan wapnia: 0,35% - DL-metionina: 0,029%.

Zalecane dzienne dawki (g/dzień):

Masa ciała kota	Niedowaga	Prawidłowa masa ciała	Nadwaga
2 kg	170	140	110
2.5 kg	195	165	130
3 kg	225	185	150
3.5 kg	250	210	165
4 kg	275	230	185
4.5 kg	300	250	200
5 kg	325	270	215
5.5 kg	345	290	230
6 kg	365	305	245
6.5 kg	390	325	260
7 kg	410	340	275
7.5 kg	430	360	285
8 kg	450	375	300
8.5 kg	470	390	315
9 kg	490	410	325
9.5 kg	510	425	340
10 kg	530	440	350

Dobór diety weterynaryjnej powinien zawsze zostać skonsultowany z lekarzem weterynarii, który wcześniej zdiagnozował zwierzę i uwzględnił ewentualne przeciwwskazania w dietoterapii.